


AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

Départements : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne



Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

62, avenue Nationale - La Neuville
 B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX
 Téléphone : 26.09.06.43

PUBLICATION PÉRIODIQUE

Abonnement annuel :

Edition A ou B : 150 F.

Edition A + B : 285 F.

ÉDITION GÉNÉRALE - GRANDES CULTURES

DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

- 1 -

Bulletin n° 5 du 27 mars 1986

Envoi n° 5

COLZA : . LE VOL DE CHARANCON DE LA TIGE EST BLOQUE.. PREMIERES TACHES DE CYLINDROSPORIOSE SUR
JET NEUF.**ORGE - ESCOURGEON** : MOSAIQUE JAUNE**COLZA****Charançon de la tige du colza**

. Le vol débuté entre le 13 et le 17 mars est interrompu par l'arrivée de la pluie. La semaine dernière, des captures ont été enregistrées dans le Sud de l'Aube et de la Marne et en Haute-Marne.

Les insectes piégés étaient en grosse proportion des charançons de la tige du chou (non dangereux).

. Des confusions sont possibles entre les 2 espèces capturées à cette époque.

Préconisation :


- . Visitez vos pièges jaunes régulièrement, surtout dès le prochain réchauffement.
- . Différenciez les charançons de la tige du chou (non dangereux) des charançons de la tige du colza (dangereux).
- . Ne traitez que si le seuil d'intervention est atteint. La persistance d'action des insecticides étant de l'ordre d'une semaine, une intervention trop précoce risque de se traduire par un échec.

ERRATUM :

Dans notre dernier bulletin n° 4 du 19 mars, ajoutez la deltaméthrine à la liste des matières actives utilisables contre le charançon de la tige du colza.

SACHEZ LES RECONNAÎTRE !

charançon de la tige	du colza (C. napi)	du chou (C. quadridens)
couleur	gris foncé	gris clair
taille	2,5 à 4 mm	2,5 à 3 mm
pattes	noires	extrémités rousses
poils	non	oui
		tache blanche sur le dos



CYLINDROSPORIOSE :

Les toutes premières taches de cylindrosporiose sont apparues la semaine passée :

- Seule la variété Jet Neuf est concernée actuellement.
- Le niveau d'attaque reste très faible (quelques pieds par parcelle).

Préconisation :

- Aucune intervention n'est à envisager pour l'instant.

Un nouveau point sera fait dans 2 - 3 semaines.

ORGE - ESCOURGEON

MOSAÏQUE JAUNE

Cette maladie à virus transmise par un champignon du sol entraîne une réduction du système racinaire et de la taille de la plante.

Les dégâts :

Les pertes de rendement varient de 5 à 50 % selon l'enracinement, la pluviométrie de juin et la proportion de pieds touchés.

Les symptômes :

Dans la parcelle : présence de ronds ou bandes jaunes de plusieurs dizaines de mètres carrés.

Sur la plante : présence de tirets jaunâtres sur la feuille la plus jeune (seuls symptômes caractéristiques).

Méthode de lutte :

Il n'existe pas de lutte chimique possible. Seules les variétés tolérantes permettent d'éviter des pertes de rendement.

Variétés sensibles	Variétés tolérantes
Barberousse	Diana, Sonate
Capri	Neger, Birgit
Gerbél, Illia	Franka, Gallion
Mogador, Panda	Hexa, Ogra
Robur	

. Dans les cas graves, le remplacement de la culture peut être envisagé. Consultez votre technicien habituel. Pensez aux variétés tolérantes pour les années à venir.

. Sur les parcelles faiblement atteintes, il est souvent utile :

- de relancer la végétation par un apport d'azote.
- d'éviter les désherbants antigraminées.
- de soigner la protection fongicide.
- de proscrire tout emploi de régulateur de croissance.

Vous n'êtes pas abonné à un centre serveur télématique ?

Vous pouvez malgré tout consulter les messages de la Protection des Végétaux sur Télétel 3, code EDIMK.